

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановлением от 30 октября 2020 г. № 92 внесены изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217 в части требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфекции COVID-19, а также разработаны рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях.

Для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции среди работников промышленных предприятий необходимо обеспечивать безусловное выполнение ряда мероприятий. В частности, это:

1. Административные (организационные) мероприятия.

1.1. Разработка локального документа, определяющего план работы организации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19.

1.2. Ограничение проведения любых массовых мероприятий с численностью участников более 5 человек, предполагающих очное участие, а также ограничение участия работников в мероприятиях других коллективов.

1.3. Исключение доступа в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением выполнения работ, связанных с

производственными процессами. Обеспечение руководителями организаций контроля за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания при отсутствии возможности создания условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 м).

1.4. В случаях доставки работников на работу во время поездки предусмотреть соблюдение принципов социального дистанцирования при рассадке работников, обеспечить функционирование вентиляции в салоне транспортного средства.

1.5. Осуществление в установленном порядке технического контроля за функционированием систем вентиляции, по возможности увеличение кратности воздухообмена на рабочих местах. В местах общего пользования (объекты питания, гардеробы для работников и др.) целесообразна установка устройств для обеззараживания воздуха.

1.6. Обеспечение неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции и антисептических средств, СИЗ; постоянный контроль за своевременным пополнением запасов и соблюдением нормативов обеспечения работников СИЗ.

1.7. Обеспечение безопасного питьевого режима работников (оснащение кулерами с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками

Е. В. СМЕРНОВА,

врач-гигиенист (заведующий отделением гигиены труда) отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»



ми либо бутилированной водой в небольшой расфасовке).

2. Контроль состояния здоровья работников.

2.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с целью недопущения на работу лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, повышенная температура тела и т. д.) с контролем температуры тела перед началом рабочей смены, опросом о наличии признаков респираторных заболеваний.

3. Соблюдение правил личной гигиены.

3.1. Обеспечение условий для соблюдения гигиены рук сотрудниками (мытьё рук с мылом или обработка с использованием средств дезинфекции кожных покровов / антисептика для кожи).

4. Использование СИЗ.

4.1. Обеспечение работников на рабочих местах запасом масок (исходя из продолжительности рабочей смены и кратности смены масок не реже 1 раза в 2 часа), перчатками (при необходимости – средствами дезинфекции в виде растворов, салфеток для обработки рук).

4.2. Обеспечение контроля за правильным использованием работниками СИЗ.

5. Уборка помещений.

5.1. Обеспечение регулярной влажной уборки помещений с использованием моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с рекомендациями производителя по вирулицидному (эфективному в отношении вирусов) режиму.

5.2. Обеспечение регулярного проветривания помещений.

6. Социальное дистанцирование – комплекс немедикаментозных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания.

Необходимо помнить, что основными клиническими проявлениями коронавирусной инфекции COVID-19 являются: повышение температуры тела до 38–39 °С, кашель, одышка, отсутствие обоняния, мышечная и головная боль и другие симптомы, при этом возможно бессимптомное заболевание. Поэтому при повышении температуры или появлении подозрительной симптоматики необходимо остаться дома и вызвать врача.